

MORSURE DE TIQUES

DÉFINITION

Une tique est un acarien qui se fixe à la peau et se nourrit de sang humain.

Elle peut, dans de rares cas, transmettre des maladies graves (maladie de Lyme ; méningo-encéphalite à tiques).

La tique est très présente dans les champs, sous-bois, notamment d'avril à octobre. Il y a donc un risque important de morsure en camp scout !

PRÉVENTION

- Porter des **vêtements longs et fermés** ainsi qu'un **chapeau**
- Inciter les jeunes à s'inspecter **soigneusement tout le corps et le cuir chevelu chaque jour** (les tiques apprécient les zones chaudes et humides telles qu'aisselle, région génitale, pli des genoux, derrière les oreilles, ...)
- En cas d'infestation, des **répulsifs** peuvent être indiqués, mais ils contiennent des insecticides chimiques.

QUE FAIRE ?

- **Retirer** la tique le plus tôt possible : **idéalement** à l'aide d'un **tire-tique** (agripper la tique le plus près possible de la peau puis tourner la tique de ½ tour en tirant). Sinon à l'aide d'une **pince fine** (pince à épiler) : tirer doucement mais fermement sans rotation.
- **Ne pas utiliser d'éther** car cela provoque la régurgitation de la tique et augmente le risque d'infection
- Désinfecter ensuite la zone
- **Noter** date et lieu (de la zone du corps mordu) de la morsure sur la fiche sanitaire de liaison pour le suivi ultérieur de la morsure.
- Si besoin **identifier** la zone de morsure à l'aide d'un stylo pour se la rappeler
- **Surveiller la zone de la morsure** pendant 30 jours afin de détecter l'apparition d'une auréole rouge qui s'étend. Elle peut être parfois accompagnée de fièvre, maux de tête, courbatures, douleurs articulaires. Un point rouge peut rester à l'endroit de la morsure pendant plusieurs jours.
- **Signaler aux parents** la morsure en fin de camp afin de poursuivre la surveillance et leur remettre la fiche sanitaire de liaison annotée.

QUAND CONSULTER UN MÉDECIN ?

Il faudra **consulter un médecin**, au moindre doute dans les cas suivants :

- Durée d'attachement de la tique supérieur à 48-72 heures
- Durée d'implantation de la tique inconnue mais tique gorgée de sang au moment du retrait

- En cas de survenue d'une auréole rouge ou d'un syndrome grippal (courbatures, fièvres, maux de tête)
- Retrait partiel de la tique

Source :

<http://www.ameli-sante.fr/morsures-de-tiques.html>

